

# โรคไข้ฉี่ดาอีแดง (scarlet fever)

เป็นโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็ก  
อายุระหว่าง 5-15 ปี โรคนี้เกิดจากเชื้อ  
แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสชนิดเอ  
(streptococcus group A) ผู้ป่วยโรคไข้  
ฉี่ดาอีแดงจะมีอาการไข้สูง เจ็บคอ และมีผื่นสี  
แดงขึ้นตามผิวหนังเกือบทั่วร่างกาย ผื่น  
ดังกล่าวมักเริ่มขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง  
หลังเริ่มมีไข้ โดยเริ่มจากบริเวณรักแร้ คอ  
หรือขาหนีบ แล้วกระจายไปทั่วลำตัว แขน  
และขา ผื่นมีลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ คล้าย  
กระดาษทราย และจะแดงมากเป็นพิเศษตาม  
จุดที่เป็นข้อพับ เช่น ข้อศอก หรือรักแร้  
นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการลิ้นแดงคล้าย  
สตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรค  
นี้

## ติดต่อเรา



039-387-110



admin@tessabanpong.go.th



www.tessabanpong.go.th



เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

222 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.  
จันทบุรี 22140



เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

# โรคไข้ฉี่ดาอีแดง (scarlet fever)

ไข้ฉี่ดาอีแดง โรคติดต่อในเด็กที่พบบ่อย  
ไม่ควรมองข้าม

# เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้ดำแดง (Scarlet fever) ควรปฏิบัติดังนี้

## 1. แยกผู้ป่วย

ให้ผู้ป่วยพักผ่อนและแยกตัวจากคนอื่นในบ้าน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ.

## 2. รักษาแพทย์

หากมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคนี้ (เช่น ไข้ เจ็บคอ ผื่นแดง) หรือมีผลบวกจากการตรวจ ATK ควรรักษาแพทย์โดยเร็ว.

## 3. ใหยาปฏิชีวนะ

หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้ดำแดง ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาปฏิชีวนะ (เช่น เพนิซิลลินหรืออะม็อกซิซิลลิน) ให้ครบตามที่แพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเอง แม้ว่าอาการจะดีขึ้น

## 4. ดูแลตามอาการ

บรรเทาอาการไข้และเจ็บคอด้วยยาพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟน กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานอาหารอ่อนๆ

## 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัส

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องสัมผัส ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

## 6. ป้องกันการแพร่กระจาย

สอนให้ผู้ป่วยปิดปากเมื่อไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น (เช่น แก้วน้ำ ช้อน).

## 7. ดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ.

## 8. สวมหน้ากากอนามัย

เมื่อออกไปนอกบ้านควรให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

## 9. ให้หยุดเรียน

หากผู้ป่วยเป็นนักเรียน ควรให้หยุดเรียนจนกว่าจะไม่มีไข้และอาการดีขึ้นหรือหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

